

Grille d'évaluation pour l'implantation d'une race prolifique dans mon élevage

Avant d'introduire une race prolifique dans votre élevage, l'Arcott Rideau par exemple, il importe de répondre à quelques questions qui vous permettront d'évaluer si votre régie actuelle permet l'élevage d'une race prolifique. Voici donc une auto-évaluation de vos habitudes de travail à la bergerie...

Des améliorations de vos pratiques d'élevage seront-elles nécessaires? À vous d'en juger!

Alimentation et Santé	Jamais	Rarement	Souvent	Toujours
Je fais faire mes programmes alimentaires (PA) pour chaque stade physiologique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je fais analyser mes fourrages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je décide du moment de la récolte de mes fourrages pour optimiser la qualité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si j'achète mes fourrages, je demande les analyses avant l'achat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lors des repas, j'offre les fourrages en premier, suivis des divers concentrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des minéraux sont servis quotidiennement aux animaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'évalue régulièrement l'état de chair de mes brebis afin de modifier mon PA en conséquence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les animaux <u>ont pas</u> de troubles pulmonaires (ex.: pneumonies)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reproduction				
Je fais faire des échographies environ 35 jours après le retrait de mes béliers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La période de mise au bélier est de 30 à 40 jours afin de regrouper les agnelages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'utilise un harnais marqueur sur tous mes béliers lors des saillies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je fais un examen de santé de mes béliers avant de les mettre à l'accouplement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je fais les soins des agneaux à la naissance (injection vitamines A-D-E Se, désinfection du nombril, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des parquets à la dérobée sont disponibles pour les agneaux dès l'âge de 7-10 jours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestion des bâtiments et conditions d'ambiance				
Tous les animaux ont de la place en même temps à la mangeoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La densité des parcs respecte les normes du Guide de Production Ovine (ex.: 20pi ² /brebis en lactation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La ventilation de mes bâtiments est adéquate et maintient le taux d'humidité à moins de 80%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La température de mes bâtiments varie de 0 à 14°C mais je contrôle très bien l'humidité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les parcs sont paillés adéquatement, surtout ceux des brebis en lactation et des agneaux à l'engraissement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sélection et Conformation des sujets de remplacement				
Je choisis mes sujets de remplacement en évaluant la conformation des animaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La capacité d'un animal est un critère de conformation auquel j'accorde beaucoup d'importance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mon taux de remplacement et de réforme est d'environ 20% par année	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Régie de troupeau				
J'ai un carnet d'agnelage et je prends beaucoup de notes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'utilise une case d'agnelage les 24 premières heures suivant les mises-bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je gère mes agnelles séparément de mes brebis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je possède des lampes chauffantes que j'utilise, surtout en hiver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Si vous avez coché des cases "jamais" ou "rarement", il est évident que des changements s'imposent afin d'introduire avec succès une race prolifique dans votre élevage. Avec l'aide d'un conseiller technique spécialisé en production ovine, il vous serait certainement possible d'améliorer certaines de vos pratiques ou installations afin d'augmenter vos chances de réussite avec une race telle que l'Arcott Rideau. La plupart des énoncés ci-haut font référence à des habitudes de travail et ne requièrent pas vraiment d'investissement. Ainsi, de simples changements dans votre routine d'alimentation ou régie de troupeau, par exemple, suffiraient à améliorer les conditions de votre élevage et ainsi faciliter l'introduction d'une race prolifique.

